




SAINTE-MARIE-DU-MONT

Descriptif de site :



Côte basse à l'entrée de la Baie des Veys. Estran à barres, cordon dunaire étroit, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+142 247 m³**

COMMENTAIRES :

Secteur sud : schorre qui évolue peu. Au nord, migration de bancs sableux qui viennent s'accoler au trait de côte. Bilan positif sur l'estran de ce secteur nord, de l'ordre de +40 000 m³, malgré deux secteurs en déficit : au nord immédiat du musée et plus au nord, au droit de l'hippodrome Grande Dune





ST-MARTIN-DE-VARREVILLE

Descriptif de site :



Côte basse, estran à barres, parcs conchy., cordon dunaire étroit, vaste zone basse.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-14 922 m³**

COMMENTAIRES :

Les évolutions observées sur l'estran sont liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Bilan à l'érosion généralisée de l'estran, de l'ordre de -45 000 m³. Les secteurs en accrétion sont très localisés, souvent aux abords d'émissaires, de cales, de protubérances ou de vestiges de la guerre.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



ST-MARCOUF – STE-MERE

Descriptif de site :



Côte basse, estran étroit à barres, cordon dunaire fin, syst. d'endiguement avec D421, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2016-2011 : **-42 791 m³**

COMMENTAIRES :

Les évolutions observées sur l'estran sont liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Bilan à l'érosion généralisée de l'estran, de l'ordre de -47 000 m³. Les secteurs en accrétion sont très localisés, souvent aux abords d'émissaires.





FONTENAY-SUR-MER

Descriptif de site :



Côte basse, estran à barres, parcs conchy., zone basse, enjeux bâtis, syst. d'endiguem^{nt} local, Sinope.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+16 748 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan global légèrement positif sur l'estran, de l'ordre de +4 300 m³, avec une distinction entre le sud de l'embouchure de la Sinope (-16 200 m³) et le nord (+20 500 m³).





CRASVILLE - QUETTEHOU

Descriptif de site :



Côte basse, anse du Cul de Loup abritée, envasée, estran large, parcs conchy, enjeux bâtis.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+60 497 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan global très positif sur l'estran, de l'ordre de +45 000 m³. La commune de Crasville (-10 000 m³) se distingue de celle de Quettehou (+55 000 m³), plus abritée. Le traitement différent appliqué aux deux levés concernant la donnée « sursol » (ici le schorre à Crasville) peut accentuer ce contraste.





St-VAAST-LA-H. - REVILLE

Descriptif de site :


Côte basse, Baie de Saire, estran large, parcs conchy, ile de Tatihou, zone basse, PPRL, syst. d'endiguement

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-117 928 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan équilibré pour la rive ouest de la baie de Saire au pied de la digue, et positif pour sa rive nord, du Pont de Saire à la Roque Jaune (+9 500 m³). La Pointe de Saire et la moitié sud du littoral oriental de Réville sont en revanche en déficit sédimentaire (-107 000 m³).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



REVILLE - MONTFARVILLE

Descriptif de site :



Côte basse à marais, estran rocheux, anses sableuses, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-118 666 m³**

COMMENTAIRES :

La moitié nord du littoral oriental de Réville et celui de Montfarville sont en déficit sédimentaire (-91 500 m³, dont la moitié pour Réville).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



GATTEVILLE-LE-PHARE

Descriptif de site :


Côte basse, grande anse sableuse, poin^{te} de Barfleur et bas estran rocheux, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+35 825 m³**

COMMENTAIRES :

Estran en accrétion sur la partie orientale de l'anse de Gattemare (Gatteville-le-Phare, +65 000 m³ sur un linéaire de 1 km), en érosion sur la partie occidentale (Vicq-sur-Mer, -50 000 m³ sur un linéaire de 2,6 km). Evolutions mineures à la périphérie de la Pointe de Barfleur.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



VICQ-SUR-MER

Descriptif de site :


Côte basse, anse sableuse de Réthoville, moyen et bas estran rocheux, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-78 555 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran de la partie orientale de l'anse de Réthoville (au droit de Neville/Mer, +21 500 m³ sur 900 m de linéaire) mais négatif pour sa partie occidentale (au droit de Réthoville, -60 000 m³ sur 1 km de linéaire). Schéma similaire plus à l'ouest, de part et d'autre de la Pointe des Mares.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





VICQ-SUR-MER

Descriptif de site :



Côte basse, estran rocheux, petites plages sableuses étroites, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+29 819 m³**

COMMENTAIRES :


Estran en érosion à l'est de la pointe de la Loge (plages du Sablon et du Vicq, -20 000 m³ sur 2,3 km) et en accrétion à l'ouest (baie de Tocquebœuf et anse de la Saline, +26 000 m³ sur un linéaire équivalent).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



FERMANVILLE

Descriptif de site :



Estran rocheux, falaises et plages de poche à l'ouest, côte basse à l'est et plage plus étendue, zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- Mondrée : **+6 372 m³**
- Anse du Brick : **-358 m³**

COMMENTAIRES :

L'estran de la Mondrée bénéficie d'un bilan équilibré, résultant d'une érosion de sa partie ouest (-4 700 m³) et d'un transfert des sables vers sa partie est qui s'est engraisée (+4 400 m³). L'anse du Brick est en érosion modérée sur la période (-1 000 m³).






CHERBOURG-EN-COTENTIN

Descriptif de site :

Anse de Collignon, à l'est Digue Est, largeur d'estran décroît vers l'est (port du Becquet), zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :


- 2016-2011 : **+20 953 m³**



COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire positif pour la plage de Collignon, avec +14 200 m³ pour le haut estran. Les accumulations se situent principalement au droit du camping « les Cottages de Collignon » et de la base de loisirs, ainsi qu'à l'extrémité est contre le port du Becquet. Une érosion est à l'inverse observée le long de la Digue de l'Est.





LA HAGUE – URVILLE-N.

Descriptif de site :



Côte basse à très basse, bas estran partiellement rocheux, enjeux bâtis, zone basse submersible.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+6 073 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran d'Urville-Nacq. (-3 600 m³), avec cependant une distinction entre le tiers occidental en érosion à l'ouest de la zone urbanisée (-39 800 m³) d'une part, et les deux tiers orientaux en accrétion d'autre part (+36 200 m³, malgré une érosion locale en pied de parcelles).





LA HAGUE - VAUVILLE

Descriptif de site :


Anse de Vauville, 10km de long, partie nord, cordon dunaire fin, zone humide en arrière, plage exposée.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+121 762 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement positif pour l'estran de cette moitié nord de l'anse de Vauville avec +140 800 m³. Erosion à l'extrémité nord au pied des falaises. Les plus fortes accumulations se situent entre la Crecque et la Rigoletterie (+109 100 m³) et s'atténuent vers le sud (érosion de la dune et de la moyenne plage).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



LA HAGUE – SIOUVILLE-H.

Descriptif de site :


Anse de Vauville, partie sud, dunes de Biville. Cordon dunaire $h > 5\text{m}$, s'abaissant vers le sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-52 357 m³**

COMMENTAIRES :

Moitié sud anse de Vauville : bilan équilibré avec, sur la commune de la Hague, sédimentation sur l'estran, contrebalancée par une érosion dunaire. Héauville : estran en érosion au nord du Grand Douet et en accrétion au sud. Siouville-Hague : forte érosion de la moyenne plage devant Clairefontaine.



Légende

--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





LES PIEUX – LE ROZEL

Descriptif de site :


Anse de Sciotot, 4km de long. Côte basse, cordon dunaire, cordon de galets en pied en partie nord.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+154 698 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran de l'anse de Sciotot, avec +115 000 m³, malgré une érosion aux deux extrémités, en particulier sur la moyenne plage jouxtant le cap du Rozel. Erosion des dunes localement. Principales zones de dépôt : au sud du bourg de Sciotot et au nord du camping Le Ranch.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



SURTAINVILLE

Descriptif de site :


Anse de Surtainville, 11km jusqu'à Carteret, partie nord, cordon dunaire très étroit au Pou.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-33 367 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran de cette partie nord de l'anse de Surtainville, avec +136 000 m³. Accrétion résiduelle sur l'estran du Pou aux Vertes Fosses (+175 000 m³), et érosion plus au sud (-39 000 m³). Érosion des dunes sur la quasi-totalité du linéaire, accentuée sur la partie nord de Surtainville.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



BAUBIGNY

Descriptif de site :


Anse de Surtainville, 11km jusqu'à Carteret, partie sud, dunes de Baubigny / Hattainville.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-166 534 m³**

COMMENTAIRES :

Sur la partie sud de l'anse de Surtainville, bilan très négatif pour l'estran, avec -198 000 m³ (dont la moitié érodée au sud immédiat des roches du Rit, point d'inflexion de la côte, fort abaissement de profil). A l'abri de ces roches, 42 000 m³ se sont néanmoins déposés. Erosion généralisée des dunes.



Légende

--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





BARNEVILLE-CARTERET

Descriptif de site :




Abords du cap de Carteret, dunes d'Hattainville au nord, havre et delta au sud, plages à bancs sableux.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+11 843 m³**

COMMENTAIRES :

Partie sud des Moitiers-d'Allonne, jusqu'au Cap de Carteret : bilan négatif pour l'estran avec -59 200 m³, malgré une accrétion de la moyenne plage au sud des roches du Rit. Dunes en érosion. Du Cap à la jetée ouest, bilan négatif avec -3 100 m³. Bilan positif à l'extrémité de la flèche sud du havre (+26 700 m³).





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :



Cordon dunaire peu élevé entre havres de Carteret et Portbail, enrochement extrémités nord et sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+71 788 m³**

COMMENTAIRES :

De Barneville-Carteret à l'embouchure du havre de Portbail, bilan positif pour l'estran, avec +42 300 m³. Cependant, érosion au droit de la Digue St-Jean (-32 000 m³). Faible variation jusqu'aux Mielles de Rambut. L'accrétion s'est principalement produite entre ces Mielles et la cale de la D15 (+60 000 m³).





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :



Havres et dunes au nord et au sud (Portbail / Surville), Denneville-pl. au centre, enrochements.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-22 671 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran, avec -96 500 m³. Les principales évolutions (négatives) s'observent de part et d'autre de l'embouchure du havre, du camping du Vieux Fort à Lindbergh-plage (-86 500 m³ rien qu'au droit de ce second site). Evolutions modérées devant Denneville et plus au sud.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



LA HAYE – BRETTEVILLE

Descriptif de site :



Havre (Survile) / dunes de la Poudrière au nord, cordon étroit / zone basse de Bretteville-s/Ay au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+152 783 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour le haut estran situé au sud du havre de Survile (+85 700 m³), jusqu'au nord de Bretteville-sur-Ay où les premières érosions significatives apparaissent. Erosion dunaire sur une grande partie du littoral, sauf sur la flèche sud du havre de Survile.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



BRETTEVILLE-SUR-AY

Descriptif de site :



Cordon dunaire étroit et zone basse à Bretteville-sur-Ay, enrochement, dunes et havre à S^t-Germain/Ay.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-67 344 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif pour le haut estran de ce secteur (-102 300 m³), avec une érosion croissante vers le sud. Important engraissement à l'extrémité de la Pointe du Banc cependant. Erosion dunaire sur l'intégralité de la Pointe du Banc.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



CREANCES - PIROU

Descriptif de site :



Dunes de la pointe du Banc et de Créances, havre de Lessay et delta, cordon dunaire de Pirou.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+535 625 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire très positif pour le haut estran, avec +456 100 m³. L'essentiel des dépôts s'est produit dans l'ex-anse d'érosion, au nord de la cale de Créances. Plus au sud, les évolutions sont moindres (+24 400 m³), positives pour Créances, négatives pour Pirou-nord, avec une érosion dunaire.





PIROU - GEFFOSSES

Descriptif de site :


Pirou-plage au nord, perré sur 1,2 km, zone basse de la Bergerie et havre de Geffosses au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+79 494 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour le haut estran, du nord de Pirou-plage à l'embouchure du havre de Geffosses (+22 400 m³). La principale zone de dépôt (+50 000 m³) se situe au niveau de la flèche nord du havre, au droit du point d'inflexion de la côte. Erosion entre Pirou-pl. et la cale de la Bergerie, et sur le haut du delta de jusant.



Légende

--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





GOUVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Geffosses et Anneville-plage au nord, dunes au centre et au sud, Gouville-pl. érodée.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-95 978 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan très négatif (-177 800 m³) pour le haut estran entre le havre de Geffosses et les cabines de Gouville/ Mer, malgré l'engraissement au droit d'Anneville-pl. (+37 600 m³). Plus au sud, érosion croissante vers la cale de Gouville (-205 200 m³), avec recul dunaire. Stabilisation au sud de la cale.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





BLAINVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Blainville, flèche nord étroite en érosion, flèche sud érodée en 2008, pieux hydrauliques.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-47 560 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran entre la plage de Gonnevillle et le Banc du Nord (-105 500 m³), avec une érosion croissante vers le sud. Evolutions plus modérées au sud de la cale du Grand Herbet (+27 000 m³), avec accrétion sur la plage au nord de La Poulette et érosion au droit du casino.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



AGON-COUTAINVILLE

Descriptif de site :


Extrémité sud Agon, épis et enrochement au nord, érosion au sud, Pte d'Agon et havre de Regnéville.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+87 443 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif du sud du Casino d'Agon à la Pointe d'Agon (+17 000 m³), malgré une importante érosion entre le poste SNSM et la Charrière des Saulx au sud du Passous (-99 200 m³). En dehors des encoches d'érosion au sud de l'école de voile et de la cale des Moulières, la dune tend à se développer.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m


42.0 N° de Box



Donnée 2011 : RGEalti® de l'IGN

Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL

* La comparaison altimétrique peut être faussée en arrière du trait de côte, en raison d'un nettoyage différent de la donnée « sursol » (végétation, ...)



MONTMARTIN-SUR-MER

Descriptif de site :



Pointe d'Agon, havre de Regnéville, digue submersible, érosion, zone basse, Hauteville / Mer enrochée.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-234 178 m³**

COMMENTAIRES :

Au nord de la digue submersible, croissance du delta de flot en rive droite de la Sienne et érosion de sa rive gauche. Bilan très négatif pour l'estran couvert (-255 000 m³). Au sud de la digue, évolutions moindres avec un bilan négatif (-13 600 m³) mais accrétion au creux de l'anse de Montmartin (D73).





LINGREVILLE

Descriptif de site :


Dunes d'Annoville au nord, Lingreville, havre de la Vanlée au sud, peu d'enjeux en front de mer.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-228 730 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran d'Annoville-Lingreville (-162 700 m³), érosion croissante vers le sud, mais des dunes qui se confortent (hormis dans l'embouchure du havre). Extrémité de la flèche sud du havre également sapée par le chenal de la Vanlée (-256 100 m³), engraissement au sud (+84 600 m³).



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





ST-MARTIN-DE-BREHAL

Descriptif de site :


Havre de la Vanlée et golf au nord, enrochement Bréhal / Coudeville sur 2,2 km, aérodrome au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-131 754 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de Bricqueville/Mer-sud à Bréville/Mer-nord (-152 500 m³), avec une érosion décroissant vers le sud. Les plus fortes érosions sont localisées entre le camping de la Vanlée et le golf de Bréhal, les plus faibles à l'extrémité des pistes de l'aérodrome.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





DONVILLE-LES-BAINS

Descriptif de site :


Dunes de Bréville au nord, hippodrome, campings, parking, enrochements, perré en béton au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+1 445 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran de Bréville/Mer-sud et Donville-les-Bains (-54 000 m³) avec une intense érosion au nord de la cale de l'établissement thermal, jusqu'à la limite communale Bréville / Donville (-42 600 m³).
Bilan négatif pour Granville-nord (-8 700 m³).



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





GRANVILLE

Descriptif de site :



Falaises de Granville au nord, St-Pair/Mer et havre du Thar au centre, Kairon-pl. enrochée au sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+12 480 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran du secteur s'étendant de Granville-sud à Kairon-plage (Saint-Pair/Mer) avec -27 000 m³. Accrétion cependant sur les plages du Hérél et d'Hacqueville (+10 500 m³), ainsi que devant le perré de Saint-Pair et la flèche sud du Thar ; érosion des plages sur le reste du littoral.





JULLOUVILLE

Descriptif de site :


Kairon-plage, Jullouville et Carolles-pl. protégées par des ouvrages sur la quasi-totalité du linéaire (4,8 km).

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **+278 003 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran du secteur s'étendant de Kairon-plage (Saint-Pair-Mer) à Carolles-plage, avec +52 900 m³, essentiellement lié à l'accrétion constatée au sud de la place du Casino de Jullouville (érosion de la plage sur la moitié nord du linéaire). Artefact sur la zone urbanisée.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





SAINT-JEAN-LE-THOMAS

Descriptif de site :


Enrochements de St-Jean-L-Th. au nord, dunes en érosion au sud, marais de la Claire Douves en arrière.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : **-424 626 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan fortement négatif pour le haut estran de ce secteur, avec -395 600 m³. Avec une distinction entre la plage Saint-Michel au droit de l'enrochement (-37 300 m³) sur laquelle ne subsiste plus beaucoup de sables, et la plage de Pignochet à Dragey-Ronthon (-358 300 m³) qui a subi une forte érosion de la plage et un recul dunaire.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





DRAGEY-RONTHON

Descriptif de site :



Cordon dunaire assez large, en recul au nord et au sud, flèche sableuse au centre et au Bec d'Andaine, estran très large, schorre au sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : + 436 499 m³

COMMENTAIRES :

Estran en accrétion au sud de « La Dune » avec développement d'une flèche sableuse (+90 000 m³ sur 900 m), érosion équivalente sur 900 m plus au sud, puis accrétion jusqu'au Bec d'Andaine (+320 000 m³). Dune en accrétion, sauf sur 800 m au nord du Bec d'Andaine.





GENÊTS

Descriptif de site :



Côte basse abritée, dunes et marais délimités par des talus de tange, estran très large, sablo-vaseux, schorre

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2016-2011 : + 699 018 m³

COMMENTAIRES :


Estran largement occupé par le schorre, cubatures non significatives (artéfacts liés à la donnée 2016*). Accrétion de +510 000 m³ sur un linéaire 1 km de slikke à la Pointe du Grouin, liée au comblement du chenal Sée/Sélune (élev. moy. de +2,5 m en 5 ans sur 20 ha). Trait de côte fait d'un talus de tange.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box