




SAINTE-MARIE-DU-MONT

Descriptif de site :



Côte basse à l'entrée de la Baie des Veys. Estran à barres, cordon dunaire étroit, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+97 765 m³**

COMMENTAIRES :

Secteur sud : schorre qui évolue peu. Au nord, migration de bancs sableux qui viennent s'accoler au trait de côte. Bilan positif sur l'estran de ce secteur nord, de l'ordre de +25 000 m³. Deux secteurs en déficit : au sud immédiat du musée et plus au nord, au droit de l'hippodrome Gde Dune. Dune en progression.





ST-MARTIN-DE-VARREVILLE

Descriptif de site :



Côte basse, estran à barres, parcs conchy., cordon dunaire étroit, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+ 9 470 m³**

COMMENTAIRES :

Evolutions de l'estran liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Alternance de zones d'estran en accrétion (notamment sur la partie nord de Ste-Marie) et en érosion (plus au nord). Bilan à l'érosion modérée de l'estran, de l'ordre de -4 500 m³. La dune tend à progresser.





ST-MARCOUF – STE-MERE

Descriptif de site :



Côte basse, estran étroit à barres, cordon dunaire fin, syst. d'endiguement avec D421, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+38 469 m³**

COMMENTAIRES :

Les évolutions observées sur l'estran sont liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Bilan à l'engraissement de l'estran, de l'ordre de +29 300 m³. Les secteurs en érosion sont très localisés.





FONTENAY-SUR-MER

Descriptif de site :




Côte basse, estran à barres, parcs conchy., zone basse, enjeux bâtis, syst. d'endiguem^{nt} local, Sinope.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+77 496 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan global positif sur l'estran, de l'ordre de +63 400 m³ (+24 300m³ au sud de l'embouchure de la Sinope, +39 100 m³ au nord). Erosion localisée au nord du taret de Fontenay et au sud de l'embouchure de la Sinope. Quelques secteurs de dune érodée, notamment au nord des Bergeries d'Aumeville-L.





CRASVILLE - QUETTEHOU

Descriptif de site :



Côte basse, anse du Cul de Loup abritée, envasée, estran large, parcs conchy, enjeux bâtis.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+11 024 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan global positif sur l'estran, de l'ordre de +18 900 m³. La commune de Crasville (+20 500 m³) se distingue de celle de Quettehou (-1 600 m³), pourtant plus abritée. Erosion de la dune sur la partie sud de Quettehou.





St-VAAST-LA-H. - REVILLE

Descriptif de site :


Côte basse, Baie de Saire, estran large, parcs conchy, ile de Tatihou, zone basse, PPRL, syst. d'endiguement

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+110 764 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour la rive ouest de la baie de Saire au pied de la digue (+26 300 m³), ainsi que pour sa rive nord, du Pont de Saire à l'épi de Jonville (+4 000 m³). La Pointe de Saire et la moitié sud du littoral Est de Réville sont aussi en accrétion (+55 700 m³, dont plus de la moitié pour la Pte de Saire à l'est de l'épi).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



REVILLE - MONTFARVILLE

Descriptif de site :



Côte basse à marais, estran rocheux, anses sableuses, zones basses submersibles.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+84 137 m³**

COMMENTAIRES :

La moitié nord du littoral oriental de Réville et celui de Montfarville sont en accrétion (+71 200 m³, dont la moitié environ pour Réville-nord). Accrétion des dunes dans les anses de Bret en Bas, du Hommet et de Brévy, érosion très localisée au droit du bourg de Maltot.





GATTEVILLE-LE-PHARE


Descriptif de site :

Côte basse, grande anse
sableuse, poin^{te} de Barfleur
et bas estran rocheux,
zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **+1 530 532 m³**

COMMENTAIRES :



Légende


--- Limites
communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





VICQ-SUR-MER


Descriptif de site :

Côte basse, anse sableuse de Réthoville, moyen et bas estran rocheux, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **+840 432 m³**

COMMENTAIRES :



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





VICQ-SUR-MER



Descriptif de site :

Côte basse, estran rocheux, petites plages sableuses étroites, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **+327 915 m³**

COMMENTAIRES :



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



FERMANVILLE

Descriptif de site :



Estran rocheux, falaises et plages de poche à l'ouest, côte basse à l'est et plage plus étendue, zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- Mondrée : **+95 875 m³**
- Anse du Brick : **+8 329 m³**

COMMENTAIRES :

Engraissement général de l'estran de la Mondrée (+96 200 m³), tant sur sa partie ouest (+61 800 m³) que sur sa partie est (+34 400 m³). Accrétion de la dune à l'est de l'émissaire du No et érosion à l'ouest, croissant vers la pointe du Castel. L'anse du Brick est en accrétion sur la période (+7 100 m³).





CHERBOURG-EN-COTENTIN

Descriptif de site :



Anse de Collignon, à l'est Digue Est, largeur d'estran décroît vers l'est (port du Becquet), zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+73 799 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire largement positif pour la plage de Collignon, avec +66 800 m³, lié à un fort exhaussement de la moyenne plage en particulier sur sa partie orientale (à l'inverse, érosion à la jonction haute plage / moyenne plage, significative sur la partie occidentale). Accrétion de la dune aux extrémités est et ouest.





LA HAGUE – URVILLE-N.

Descriptif de site :



Côte basse à très basse, bas estran partiellement rocheux, enjeux bâtis, zone basse submersible.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+16 186 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement positif pour l'estran d'Urville-Nacq. (+15 500 m³), avec cependant une érosion au droit de la moitié ouest du Bas de Nacqueville (-11 000 m³). Érosion dunaire localisée à l'est et à l'ouest immédiats de la zone urbanisée, ainsi qu'à l'est immédiat de l'Issue aux Moines.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



LA HAGUE - VAUVILLE

Descriptif de site :


Anse de Vauville, 10km de long, partie nord, cordon dunaire fin, zone humide en arrière, plage exposée.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-294 070 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan fortement négatif pour l'estran de cette moitié nord de l'anse de Vauville avec -194 500 m³. Erosion générale des dunes et des falaises meubles, en particulier aux extrémités nord et sud du secteur.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





LA HAGUE – SIOUVILLE-H.

Descriptif de site :


Anse de Vauville, partie sud, dunes de Biville. Cordon dunaire $h > 5\text{m}$, s'abaissant vers le sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-238 458 m³**

COMMENTAIRES :

Erosion généralisée de l'estran sur cette moitié sud de l'anse de Vauville, sauf entre le Grand et le Petit Douet. Le déficit sédimentaire atteint -140 500 m³. Erosion dunaire également sur l'ensemble du secteur, sauf entre les deux embouchures.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



LES PIEUX – LE ROZEL

Descriptif de site :


Anse de Sciotot, 4km de long. Côte basse, cordon dunaire, cordon de galets en pied en partie nord.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-89 520 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de l'anse de Sciotot, avec - 67 900 m³. Les plus fortes pertes sont localisées aux extrémités nord et sud, à proximité des caps. Bilan équilibré au débouché du But, au droit du bourg du Rozel. Erosion des dunes surtout sur Les Pieux, ainsi qu'à l'approche du Cap du Rozel.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



SURTAINVILLE

Descriptif de site :


Anse de Surtainville, 11km jusqu'à Carteret, partie nord, cordon dunaire très étroit au Pou.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-279 600 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de cette partie nord de l'anse de Surtainville, avec -235 500 m³. Plus fortes pertes entre le Pou et les Plats Mielles (sud du bourg de Surtainville). Erosion générale de la crête dunaire mais forte accrétion en pied de dune, du Pou jusqu'au hameau La Plage de Surtainville.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BAUBIGNY

Descriptif de site :


Anse de Surtainville,
11km jusqu'à Carteret,
partie sud, dunes de
Baubigny / Hattainville.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-157 003 m³**

COMMENTAIRES :

Sur la partie sud de l'anse
de Surtainville, bilan négatif
pour l'estran, avec -121 700
m³ (dont 1/3 érodés en
arrière des roches du Rit,
un autre 1/3 érodés à
extrémité sud de la zone,
avec un fort abaissement
de profil ; une zone
d'accrétion de +12 000 m³
entre les deux). Erosion
généralisée des dunes.



Légende


--- Limites
communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BARNEVILLE-CARTERET

Descriptif de site :



Abords du cap de Carteret, dunes d'Hattainville au nord, havre et delta au sud, plages à bancs sableux.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-132 470 m³**

COMMENTAIRES :

Partie sud des Moitiers-d'Allonne, du sud des roches du Rit au Cap de Carteret : bilan négatif pour l'estran avec -68 100 m³. Dunes en érosion. Du Cap à la jetée ouest, bilan négatif avec -14 500 m³. Bilan négatif à Barneville-pl. (-35 000 m³) avec une érosion dunaire devant la station balnéaire, une accrétion plus au nord.





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :



Cordon dunaire peu élevé entre havres de Carteret et Portbail, enrochement extrémités nord et sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-63 379 m³**

COMMENTAIRES :

De Barneville-Carteret à l'embouchure du havre de Portbail, bilan négatif pour l'estran, avec -75 800 m³, essentiellement érodés au droit de Barneville-pl. et de Saint-Jean. Faible variation des cubatures plus au sud, jusqu'aux Mielles de Rambut, mais érosion dunaire notamment sur le littoral de Portbail.





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :




Havres et dunes au nord et au sud (Portbail / Surville), Denneville-pl. au centre, enrochements.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-85 541 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran, avec -107 100 m³. Les principales évolutions (négatives) s'observent de à Lindbergh-plage au niveau du point d'inflexion de la flèche sud du havre de Portbail (-64 600 m³), où la dune s'est érodée. Evolutions plus modérées mais toujours négatives devant Denneville et plus au sud.





LA HAYE – BRETTEVILLE

Descriptif de site :



Havre (Surville) / dunes de la Poudrière au nord, cordon étroit / zone basse de Bretteville-s/Ay au sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-85 940 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif pour le haut estran situé au sud du havre de Surville (-83 200 m³). Les plus fortes érosions se situent au nord de La Poudrière de La Haye et de Bretteville-sur-Ay. Accrétions très localisées au sud du havre. Erosion dunaire sur une grande partie du littoral, sauf au nord de la Poudrière.





BRETTEVILLE-SUR-AY

Descriptif de site :



Cordon dunaire étroit et zone basse à Bretteville-s/Ay, enrochement, dunes et havre à S^t-Germain/Ay.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-140 680 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif pour le haut estran de ce secteur (-117 700 m³), avec une érosion accentuée au sud immédiat de l'enrochement de Saint-Germain, accompagnée d'une érosion dunaire qui s'étend à l'ensemble de la Pointe du Banc. Accrétion localisée de l'estran à l'extrémité de cette Pointe.





CREANCES - PIROU

Descriptif de site :



Dunes de la pointe du Banc et de Créances, havre de Lessay et delta, cordon dunaire de Pirou.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+119 463 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire positif pour le haut estran, avec +142 000 m³. L'essentiel des dépôts s'est produit dans l'ex- anse d'érosion, au nord de la cale de Créances. Erosion d'un banc au nord de l'anse. Plus au sud, les évolutions sont moindres (+12 800 m³), positives pour Créances, négatives pour Pirou-nord, avec une érosion dunaire.





PIROU - GEFFOSSES

Descriptif de site :


Pirou-plage au nord, perré sur 1,2 km, zone basse de la Bergerie et havre de Geffosses au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-83 249 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran, du nord de Pirou-plage à l'embouchure du havre de Geffosses (-43 500 m³). La principale zone d'érosion se situe au droit de Pirou-plage. Erosion de la dune sur le linéaire, sauf au niveau du point d'inflexion de la flèche nord du havre, avec pourtant une érosion de la moyenne plage ici.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m


42.0 N° de Box



Difference - LIDAR 2020-2016



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



GOUVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Geffosses et Anneville-plage au nord, dunes au centre et au sud, Gouville-pl. érodée.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-161 157 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan très négatif (-144 500 m³) pour le haut estran entre le havre de Geffosses et les cabines de Gouville/ Mer, malgré l'engraissement au droit d'Anneville-pl. (+24 300 m³). Plus au sud, érosion croissante vers les campings de Gouville, stabilisation jusqu'à la cale, érosion au sud. Érosion dunaire généralisée.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BLAINVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Blainville, flèche nord étroite en érosion, flèche sud érodée en 2008, pieux hydrauliques.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-84 947 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran entre la plage de Gonneville et le Banc du Nord (-42 000 m³), atténué par une accrétion aux abords de la cale. Erosion dunaire. Evolutions plus modérées de la cale du Grand Herbet au sud de La Poulette, mais érosion devant les enrochements à l'extrémité sud de la zone.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



AGON-COUTAINVILLE

Descriptif de site :


Extrémité sud Agon, épis et enrochement au nord, érosion au sud, Pte d'Agon et havre de Regnéville.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-49 367 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif du sud du Casino d'Agon à la Pointe d'Agon (-35 000 m³), avec une importante érosion et érosion dunaire au sud du Passous (-78 600 m³). Accrétion de part et d'autre notamment aux abords de la cale des Moulières, mais érosion de la plage et de la dune à l'extrémité de la Pointe d'Agon.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



MONTMARTIN-SUR-MER

Descriptif de site :



Pointe d'Agon, havre de Regnéville, digue submersible, érosion, zone basse, Hauteville /Mer enrochée.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-246 968 m³**

COMMENTAIRES :

Au nord de la digue submersible, croissance du delta de flot en rive droite de la Sienne et érosion de sa rive gauche. Bilan très négatif pour l'estran couvert (-323 000 m³). Au sud de la digue, évolutions moindres et bilan positif (+51 000 m³). Dune en érosion à Montmartin-nord, mais en accrétion en partie sud.





LINGREVILLE

Descriptif de site :


Dunes d'Annoville au nord, Lingreville, havre de la Vanlée au sud, peu d'enjeux en front de mer.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-33 051 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour le haut estran d'Annoville-Lingreville (+10 000 m³), mais érosion en rive nord de l'embouchure du havre. Extrémité de la flèche sud du havre également sapée par le chenal de la Vanlée (-158 600 m³), engraissement au sud (+46 700 m³) avec développement dunaire.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



ST-MARTIN-DE-BREHAL

Descriptif de site :


Havre de la Vanlée et golf au nord, enrochement Bréhal / Coudeville sur 2,2 km, aéroport au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+28 535 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran de Bricqueville/Mer-sud à Bréville/Mer-nord (+50 800 m³), avec une accrétion décroissant vers le sud. Erosion localisée entre le camping de la Vanlée et le golf de Bréhal, au nord de l'enrochement, avec érosion dunaire. Développement dunaire à Bréville-sur-Mer.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



DONVILLE-LES-BAINS

Descriptif de site :


Dunes de Bréville au nord, hippodrome, campings, parking, enrochements, perré en béton au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **+35 834 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour le haut estran de Bréville/Mer-sud et Donville-les-Bains (+12 700 m³). Cependant, érosion dunaire à Bréville et érosion de la plage de Donville au nord et au sud de la cale (-9 800 m³). Bilan positif pour Granville-nord (+29 300 m³).



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





GRANVILLE

Descriptif de site :



Falaises de Granville au nord, St-Pair/Mer et havre du Thar au centre, Kairon-pl. enrochée au sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-12 911 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran du secteur s'étendant de Granville-sud à Kairon-plage (Saint-Pair/Mer) avec +57 400 m³. Accrétion sur les plages du Hérel et d'Hacqueville notamment (+27 900 m³), ainsi qu'au sud du rocher St-Gaud (+27 200 m³). Erosion de la plage cependant devant la partie sud du perré de Saint-Pair.





ST-PAIR-s/MER - CAROLLES

Descriptif de site :


Kairon-plage, Jullouville et Carolles-pl. protégées par des ouvrages sur la quasi-totalité du linéaire (4,8 km).

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **-244 916 m³**

COMMENTAIRES :


Bilan négatif pour l'estran du secteur s'étendant de Kairon-plage (Saint-Pair-Mer) à Carolles-plage, avec -18 662 m³, essentiellement lié à l'érosion constatée devant Jullouville et Carolles-sud. Artefact sur la zone urbanisée.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





SAINT-JEAN-LE-THOMAS

Descriptif de site :


Enrochements de St-Jean-L-Th. au nord, dunes en érosion au sud, marais de la Claire Douves en arrière.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2020-2016 : **-19 465 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan légèrement positif pour le haut estran de ce secteur, avec +1 000 m³. Une distinction entre la plage Saint-Michel au droit de l'enrochement qui a gagné un peu de sables (+14 000 m³) , et la plage de Pignochet à Dragey-Ronthon (-13 000 m³) qui a subi une érosion et un amaigrissement dunaire.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2016 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL



DRAGEY-RONTHON

Descriptif de site :


Cordon dunaire assez large, en recul au nord et au sud, flèche sableuse au centre et au Bec d'Andaine, estran très large, schorre au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **+ 33 176 m³**

COMMENTAIRES :


Estran en érosion au sud de « La Dune » avec arasement d'une flèche sableuse (-55 000 m³ sur 900 m) ; accrétion plus au sud (+45 000 m³ sur 1,8 km jusqu'au Bec d'Andaine), avec migration de bancs sableux. Dune globalement en accrétion, sauf sur 500 m au nord du Bec d'Andaine.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



GENÊTS

Descriptif de site :

Côte basse abritée, dunes et marais délimités par des talus de tange, estran très large, sablo-vaseux, schorre

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2020-2016 : **+ 97 338 m³**

COMMENTAIRES :

Estran largement occupé par le schorre, cubatures non significatives (artéfacts liés à la donnée 2016*). Accrétion de +70 000 m³ sur un linéaire de 1 km de slikke à la Pointe du Grouin, malgré la migration du chenal vers le nord. Trait de côte représenté par un talus de tange.

